

סוג חיסון	למי מיועד	הערות
דלקת כבד נגיפית B	עובדי מעבדה/עובדי בית החיות/עובדי מרפאות שיניים. עובדי מעבדה העובדים עם כל דבר ממקור אנושי (לא תרבויות תאים מסחריות)	3 חיסונים (זמן 0, אחרי חודש ואחרי חצי שנה). עובדים החשופים באופן קבוע לגורמים היכולים להכיל את הווירוס, צרכים לבדוק נוגדנים ל - hepatitis B surface antigen (anti-HBs), לאחר 5 שנים.
		כל סטודנט שהתחסן בעבר, חובה עליו להציג בדיקת נוגדנים כנגד anti-HBs.
דיפתריה-טטנוס dT	עובד בית החיות. עובדים הבאים במגע עם אדמה וגינון. העובדים בשדה/שטחי בר.	במידה ולא חוסן (חיסון מלא- 3 זריקות לפחות) במהלך 10 השנים האחרונות
	כלל העובדים	בעקבות דקירה או פציעה המלווה בדימום (משמעותי), יש לקבל חיסון תוך 48 שעות.
כלבת	וטרינרים ועובדי מעבדה העובדים עם הווירוס. עובדים בשטחי בר/בשדה, העלולים לבוא במגע עם חיות בר. העובדים עם עטלפים.	<u>קטגוריות חשיפה:</u> קטגוריה 1: מגע עם פרוות בעלי חיים האכלתו או ליקוק עור שלם (לא פגוע). קטגוריה 2: נזק שטחי לעור משיניים או ציפורניים של בע"ח ללא דימום. קטגוריה 3: נשיכה או שריטה חודרת עור (עם דימום), לקיקת ריריות או עור פצוע וכן כל חשש למגע עם עטלף או חשיפה, אפילו אם אין סימני פגיעה. מגע המעביר כלבת הינו חשיפה מקטגוריות 2 או 3. טיפול מונע: 3 מנות (חיסון CCV) בימים 0,7,28. <u>אנשים העובדים עם בע"ח שעלולים להימצא נגועים בכלבת</u>, מומלץ לבדוק כייל נוגדנים לכלבת כל שנתיים. יש לתת מנת דחף, אם הכייל נמוך מ- 0.5 IU/ml. לידיעה: נגיף הכלבת רגיש לחשיפה לאור השמש, לחום, ליובש ולגורמים סביבתיים אחרים. חומר חשוד יבש אינו מעביר כלבת. רמת נוגדנים של 0.5 IU/ml ומעלה מוגדרת כאדם מחוסן. טיפול: אדם שחוסן בעבר וקיים חשד לחשיפה <u>לכלבת</u>- יש לתת 2 מנות של חיסון אקטיבי(גורם לגוף ליצר נוגדנים בעצמו) הראשון קרוב למועד החשיפה והשני 3 ימים מאוחר יותר. <u>אדם שלא חוסן בעבר וקיים חשד לחשיפה לכלבת</u>-יש לתת 5 מנות: את הראשונה קרוב למועד החשיפה והשאר: בימים 3,7,14,28 מאוחר יותר. + חיסון סביל מכיל נוגדנים המספקים הגנה מהירה למשך 3 שבועות.
דלקת כבד נגיפית A + פוליו	העובדים עם מי- קולחין או מי נחלים/מעיינות.	

החיסון : pneumococcal polysaccharide (PPV23)	העובדים עם החיידק	Streptococcus pneumoniae
Vaccinia Immune Globulin (VIG) is a medication used to treat complications from the smallpox vaccine (vaccinia virus)	העובדים עם הנגיף וכל צוות המעבדה (בה נעשית העבודה עם הנגיף)	Vaccinia virus
מנהל מעבד (PI) חייב לוודא כי הסטודנטים/החוקרים במעבדתו מחוסנים כנגד הפתוגן עימו הם עובדים (גם אם אינו מופיע בטבלה זו) - כל עוד וקיים חיסון כנגדו.		

*נגיף הכלבת מועבר רק כאשר הוא מוחדר אל תוך פצעים בעור או בא במגע עם ריריות. הנגיף נמצא ברוק של בעל החיים החולה במחלת הכלבת וברקמות העצביות שלו. חומר המכיל את נגיף הכלבת אך הינו יבש אינו מדבק. נשיכה הינה הדרך השכיחה ביותר להעברת הנגיף, אך לעיתים נדירות ביותר הוא עובר גם באמצעות שריטות ע"י ציפורניים שזוהמו ברוק, לקיקת ריריות ולקיקת עור פגוע (שאינו שלם).

חשיפות נדירות וייחודיות שתוארו, הינן חשיפות לאירוסול בקרב עובדי מעבדה המטפלת בנגיף הכלבת .

להלן דוגמאות למגע שאינו מהווה חשיפה לנגיף: לקיקת עור שלם, ליטוף של בעל חיים חולה כלבת, מגע עם דם או עם הפרשות שאינן רוק של בעל חיים חולה כלבת כגון שתן וצואה, וכן חשיפה לפצע של בעל חיים שנושך על ידי בעל חיים אחר החשוד כחולה כלבת.